

HCV

Material de Coleta

1,0 mL de soro ou plasma (EDTA).

Preparo do paciente

Jejum de 4h.

Descrição do Exame

ANTI HCV ANTI HCV TOTAL ANTI HVC ANTI VHC ANTI-VHC/ANTI-HCV ANTICORPOS ANTI VIRUS DA HEPATITE C
ANTICORPOS HEPATITE C HCV, ANTICORPOS ANTI HEPATITE C SOROLOGIA PARA HEPATITE C VHC VIRUS C DA
HEPATITE

Método

Enzimaimunoensaio.

Consevação

Refrigerado entre 2 e 8°C: 5 dias. Congelado a -20°C: 15 dias.

Interferentes

Hemólise e/ou lipemia intensa.

Valor de Referência

Não reagente.

Interpretação

A presença de anticorpos contra o vírus da hepatite C (anti-HCV), os quais podem surgir entre quatro e 12 meses após o contágio, indica contato prévio com o vírus, mas não define se a infecção é aguda, crônica ou se já foi curada, servindo apenas como um exame de triagem para a hepatite C. O diagnóstico de infecção aguda só pode ser feito com a soroconversão. Quando a pesquisa de anticorpos é positiva por teste imunoenzimático e não existem antecedentes epidemiológicos para justificar uma infecção prévia, recomenda-se a realização de um teste confirmatório pela técnica de Immunoblot (Riba 3,0) ou a pesquisa do vírus por técnica molecular (PCR).

Setor

Imunologia