Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

ADENOVÍRUS IgG

Material de Coleta
1 mL de soro.

Preparo do paciente
Jejum não obrigatório.

Descrição do Exame
Adenovírus

Método
Enzimático.

Consevação
Até 15 dias a 2-8°C e até 30 dias a -20°C .

Interferentes
Hemólise e/ou Lipemia.

Valor de Referência
Negativo:Indice inferior a 0,90 Positivo: Indice superior a 1,10 Indeterminado: Indice entre 0,90 a 1,10

Interpretação
Os Adenovirus são um grupo de vírus muito frequentes de genoma de DNA duplo (dupla hélice). Não possuem envelope bilipídico e são extremamente resistentes. Há mais de 40 sorotipos, e a infecção com um não dá imunidade contra os outros. São infecções mais freqüentes nas crianças, mas também afetam adultos. A infecção é por contaminação com detritos fecais ou mais raramente secreções de outros órgãos. Causam várias doenças tais como: Gastroenterites, com vômitos, diarréia, dor abdominal e náuseas. Conjuntivite. Faringite. Pneumonia e hepatite principalmente em imunideprimidos.

Setor
Imunologia.

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.