Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

Ca 125

Material de Coleta
Soro - 1mL

Preparo do paciente
Jejum de 8 horas Anotar idade, data da última menstruação e uso de medicamentos.

Descrição do Exame
Ca 125 Marcador tumoral Ca 125 II

Método
Quimioluminescência.

Consevação
Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

Interferentes
Hemólise e/ou lipemia intensa.

Valor de Referência
Até 35,0 U/mL.

Interpretação
Útil no acompanhamento das neoplasias de ovário e do endométrio, sobretudo para detecção de recidivas ou metástases após o tratamento. Acompanhamento em longo prazo de pacientes em remissão. Aumentados em: •Carcinoma de ovário não mucinoso epitelial (85%) •Tumores da trompa (100%) •Adenocarcinoma cervical (83%) e endometrial (50%) •Tumores trofoblásticos (45%) •Linfoma não Hodgkin (40%) •Carcinomas de células epiteliais da vulva ou cérvice (15%) •Cânceres de pâncreas,fígado e pulmão Condições que afetam o endométrio: • Gestação (27%) • Menstruação • Endometriose

Setor
Endócrino

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.