# ACETONA

## Material de Coleta
Plasma Fluoretado.(5,0 mL)

## Preparo do paciente
Anotar os tipos de produtos químicos aos quais o paciente esteve exposto nos últimos sete dias. Sugere-se que a coleta seja feita após a jornada de trabalho.

## Descrição do Exame
Acetona dosagem Propanona Dimetilcetona Eter piroacetico 2

## Método
Cromatografia a gás com detector de ionização de chama.

## Consevação
Congelado -20C: 5 dias.

## Interferentes
Hemólise

## Valor de Referência
Menor que 2,0 mg/dL Exposição ao Isopropanol:Menor que 5 mg/dL NOTA: A LEGISLACAO BRASILEIRA (NR-7) NAO ESTABELECE VALORES DE REFERENCIA OU IBMP PARA A DOSAGEM DE ACETONA PLASMATICA.

## Interpretação
A acetona é rapidamente absorvida pelo trato respiratório, calculando- se em torno de 70% a absorção de determinada concentração inalada. O seu principal efeito tóxico ocorre no sistema nervoso central. A sua inalação determina irritação e congestão brônquica, bradicardia e hipotermia.

## Setor
Toxicologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.