Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

ASPERGILLUS

Material de Coleta
Soro - -10mL

Preparo do paciente
Não é necessário preparo para este exame.

Descrição do Exame
Aspergillus Aspergillus anticorpos totais Anticorpos anti aspergillus IgE específico,mx1 fungos IgE específico, m3 Aspergillus fumeghatu

Método
Imunodifusão radial dupla

Consevação
Refrigerada 2 a 8°C: 7 dias Congelada -20°C:3 meses

Interferentes
Hemólise Lipemia acentuada.

Valor de Referência
Não reagente.

Interpretação
A sorologia é utilizada como método auxiliar no diagnóstico da Aspergilose invasiva (pulmonar, meningea). Teste negativo não exclui a doença. A sorologia é positiva em 90% dos pacientes com Aspergilomas e 70% dos casos de Aspergilose broncopulmonar alérgica. Pacientes imunocomprometidos, em uso de corticoides e antibioticos tendem a ter títulos mais baixos ou indetectáveis. Reações cruzadas com Histoplasmose, Blastomicose e Paracoccidioidomicose podem ocorrer. Diagnóstico definitivo de Aspergilose requer visualização ou isolamente do Aspergillus.

Setor
Toxicologia.

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.