Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

GLIADINA , ANTICORPO IgG e IgA

Material de Coleta
1 mL de soro.

Preparo do paciente
Jejum de 4 horas. Intervalo de mamadas para lactentes.

Descrição do Exame
Anti-gluten Doenca Celiaca

Método
Enzimaimunoensaio.

Consevação
Refrigerado entre 2 a 8°C: 7 dias. Congelado a -20°C: 30 dias.

Interferentes
Hemólise e/ou lipemia acentuada.

Valor de Referência
IgG: Índice 3,0:Negativo. IgA: Índece 1,0:Negativo.

Interpretação
Teste útil para diagnostico e monitorização do tratamento da Doença Celíaca (DC) e da Dermatite Herpetiforme. Na DC, a ingestão de gluten leva à produção de anticorpos IgG e IgA anti-gliadina e anticorpos anti-endomísio.Resultado negativo não afasta completamente DC. Apresentam sensibilidade e especificidade inferior ao anti- endomísio. A detecção de anti-gliadina IgG e importante, pois 10% dos pacientes portadores de DC tem deficiência congênita de IgA. Anti-gliadina IgA esta presente em 75 a 90% dos casos de DC. Anti-gliadina IgG esta presente em 69 a 85% dos pacientes com DC e 29% de indivíduos sem a doença.Redução dos títulos de gliadina ocorrem em meses após o inicio da restrição dietética.

Setor
Imunologia.

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.