CLEARENCE DE URÉIA

Material de Coleta
1 mL de soro. Urina de 24 horas.

Preparo do paciente
Jejum de 4 horas para coleta do sangue. Urina de 24 horas: Colher no frasco todas as urinas (da segunda micção em diante, até a primeira do dia seguinte). Deixar o frasco em geladeira, bem fechado. No dia seguinte acordar no mesmo horário e urinar no interior do frasco pela última vez. Fechar o frasco e enviar ao laboratório. Manter sua rotina diária. Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.

Descrição do Exame
Depuração de Uréia Clearence de Uréia

Método
Cinético UV.

Consevação
Refrigerada entre 2 a 8°C: 5 dias.

Interferentes
Coleta colhida fora das especificações.

Valor de Referência
41 a 65 mL/min/1,73 m²

Interpretação
O teste é útil na avaliação da função renal. Atualmente, tem sua maior utilidade em clientes renais crônicos, com ritmo de filtração glomerular abaixo de 20 mL/min. Em tais casos, a média aritmética das depurações de creatinina e uréia corresponde, com boa aproximação, à depuração de inulina, medindo mais adequadamente o andamento da filtração glomerular.

Setor
Bioquimica.

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.