Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

PARASITOLÓGICO DE FEZES

Material de Coleta
Fezes recente.

Preparo do paciente
Nenhum. Não colher após ingerir contraste radiológico. Evitar contaminação com a urina.

Descrição do Exame
Pesquisa de helmintos e protozoário nas fezes. Parasitológico

Método
Hoffmann modificado. BAERMANN E MORAES MOD. quando solicitado pesquisa de larvas de estrongilóides. de

Consevação
Refrigerado 2 a 8°C : até 12 horas.

Interferentes
Material colhido e conservado de forma inadequada.

Valor de Referência
Ausência de cistos de protozoários, ovos ou larvas de helmintos.

Interpretação
Um único resultado negativo não afasta a possibilidade de parasitose, razão pela qual devem ser examinadas três ou mais amostras, colhidas em intervalos de 5 a 30 dias. Caso a queixa principal seja prurido anal, o provável agente etiológico é o Enterobius vermiculares, o qual pode ser pesquisado por exame parasitológico colhido com fita gomada ou swab anal. Os cristais de Charcot-Leyden são observados quando há infiltrado inflamatório, com predomínio de eosinófilos, e sua presença nas fezes pode estar associada a uma parasitose causada por E. histolytica, ancilostomídeos, A. lumbricoides, T. trichiura e, eventualmente, por G. lamblia ou, ainda, a processos alérgicos.

Setor
Parasitologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.