Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

COOMBS INDIRETO

Material de Coleta
Soro- 1,0 mL

Preparo do paciente
Jejum não obrigatório. Informar se a paciente esta grávida, mês de gestação e número de filhos, se houver.

Descrição do Exame
Aglutininas anti-Rh Anticorpos naturais imunes Coombs indireto quantitativo Pesquisa de anticorpos irregulares séricos

Método
Pesquisa de anticorpos contra antígenos de grupos sanguineos, e se positivo, identificação e titulagem pelo método de aglutinação em tubos.

Consevação
Refrigerado 2 a 8ºC: 7 dias. Congelado -20°C: 30 dias.

Interferentes
Hemólise.

Valor de Referência
Ausência de anticorpos contra antigenos pertencentes aos sistemas de grupos sangüíneos.

Interpretação
A pesquisa de anticorpos irregulares ou Coombs indireto detectam imunoglobulinas IgG ou frações do complemento ligadas as hemácias, o que pode ocorrer em situações patológicas levando principalmente à hemólise. Este teste faz parte da rotina de exames no pré-natal de gestantes Rh negativo, triagem de anemias hemolíticas e provas pré- transfusionais. Reações falso-positivas podem decorrer da presença de crioaglutininas.

Setor
Hematologia

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.