Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

CREATININA

Material de Coleta
1,0 mL de soro.

Preparo do paciente
Jejum de 4 horas.

Descrição do Exame
Creatinina sérica.

Método
Cinético.

Consevação
Refrigerado entre 2 e 8 ºC: 10 dias Congelado -20°C:30 dias.

Interferentes
Hemólise.

Valor de Referência
Recém-nascido: 0,3 a 1,0 mg/dL. Até 6 anos....: 0,3 a 0,7 mg/dL. 7 a 12 anos...: 0,5 a 1,0 mg/dL; Maior que 12 anos: . sexo masculino: 0,7 a 1,3 mg/dL; . sexo feminino.. 0,6 a 1,1 mg/dL

Interpretação
É útil na avaliacao do rítmo de filtracao glomerular (RFG). É o produto de degradaçãoo da creatina, sendo sua concentração sérica não só dependente da taxa de filtração renal, mas também da massa muscular, idade, sexo, alimentação, concentração de glicose, piruvato, ácido úrico, proteína, bilirrubina e do uso de medicamentos (cefalosporinas, salicilato, trimetoprim, cimetidina, hidantoina, anticoncepcionais e anti-inflamatorios). Níveis baixos podem ser encontrados nos estados que cursam com diminuição da massa muscular.

Setor
Bioquímica

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.