

CICLOSPORINA

Material de Coleta:

Sangue total (EDTA). Colher antes da próxima dose do medicamento ou conforme orientação médica

Preparo do paciente:

Informar se esta tomando medicamentos de nome Sandimun , Sigmasporim ou outros medicamentos que contenha Ciclosporina em sua fórmula. Informar qual a dosagem diária total e em qual horário tomou o último comprimido.

Descrição do Exame:

Ciclosporina A CSA Imunossupressor

Método:

Imunoenzimático.

Consevação:

Refrigerado entre 2 e 8 °C: 7 dias.

Interferentes:

Hemólise acentuada.

Valor de Referência:

Pré-dose: TRANSPLANTADO RENAL: 150 A 300 ng/mL TRANSPLANTADO CARDÍACO, HEPÁTICO, PANCREÁTICO: 150 A 400 ng/mL

Interpretação:

A ciclosporina é uma droga imunossupressora utilizada principalmente em transplantados. Sua dosagem tem utilidade para o acompanhamento desses indivíduos, no sentido de determinar a dose adequada, reduzindo a possibilidade de nefrotoxicidade pela droga. O nível terapêutico ideal varia em relação ao tempo pós-transplante, sendo mais elevado nas primeiras semanas, mas depende também da evolução clínica do paciente.

Setor:

Toxicologia